


ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ?

от больных туберкулезом при кашле, чихании



через продукты питания (мясо и молоко больных животных)



при вдыхании высохших частиц и пыли, содержащих опасный возбудитель

при попадании возбудителя в организм человека через кожу и слизистые при их повреждении



ФАКТОРЫ РИСКА

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Прививка БЦЖ-М.

Прививка проводится детям на 3-7-е сутки после рождения (согласно Национальному календарю прививок), чтобы сформировать у них иммунитет к туберкулезу.

Проба Манту 1 раз в год (это не прививка, а диагностический тест на присутствие в организме микобактерий туберкулеза). Она проводится независимо от предыдущего результата пробы:

-детям с 12 месяцев в детских садах, школах, поликлиниках по месту жительства и до достижения 18 лет;

-детям, непривитым БЦЖ-М в период новорожденности, проба Манту ставится с 6 месяцев 2 раза в год.

Диаскинвест – это современный диагностический внутрикожный тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, по результатам которого можно выявить туберкулез. Диаскинвест не является прививкой.

Флюорография – способ диагностики туберкулеза у лиц старше 17 лет 1 раз в 2 года (кроме подростков 15-17 лет и отдельных групп населения, которым проводится флюорографическое исследование ежегодно).

Соблюдение правил гигиены:

- мойте руки перед едой, после контакта с пылью и любыми грязными предметами, после нахождения в общественных местах;

- пользуйтесь индивидуальной посудой и средствами гигиены;

- систематически проводите влажную уборку помещений и их проветривание;

- при возникновении симптомов заболевания (кашель, повышение температуры тела, одышка, потеря аппетита, снижение массы тела, кровохарканье и др.) обратитесь к врачу, пройдите минимальное медицинское обследование;

Помните, что влажные салфетки, которыми Вы протираете руки, не воздействуют на микобактерии туберкулеза (возбудителя заболевания), так как содержат спирт, а микобактерии туберкулеза кислото- и спиртоустойчивы.

Избегайте контактов с кашляющими людьми, особенно – с длительно кашляющими. Чаще бывайте на свежем воздухе.

Не переохлаждайтесь и не переутомляйтесь.

Питание должно быть сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов. Пища должна быть богатым витаминами и микроэлементами.

Регулярно занимайтесь спортом.

Ведите здоровый образ жизни! Не курите! Никотин и дым ослабляют легкие, раздражая и повреждая слизистую оболочку бронхов.

